

FRONTLINE Spot-On COMPOSITION : FRONTLINE Spot-On Chat : Fipronil 50,00 mg, Butylhydroxyanisole (E320) 0,10 mg, Butylhydroxytoluène (E321) 0,05 mg, Ethanol 0,05 mL, Excipient QSP 1 pipette 0,5 mL.

FRONTLINE Spot-On Chien S : Fipronil 67,000 mg, Butylhydroxyanisole (E320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluène (E321) 0,067 mg, Ethanol 0,067 ml, Excipient QSP 1 pipette de 0,67 mL.

FRONTLINE Spot-On Chien M : Fipronil 134,000 mg, Butylhydroxyanisole (E320) 0,268 mg, Butylhydroxytoluène (E321) 0,134 mg, Ethanol 0,134 mL, Excipient QSP 1 pipette de 1,34 mL.

FRONTLINE Spot-On Chien L : Fipronil 268,000 mg, Butylhydroxyanisole (E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluène (E321) 0,268 mg, Ethanol 0,268 mL, Excipient QSP 1 pipette de 2,68 mL.

FRONTLINE Spot-On Chien XL : Fipronil 402,000 mg, Butylhydroxyanisole (E320) 0,804 mg, Butylhydroxytoluène (E321) 0,402 mg, Ethanol 0,402 mL, Excipient QSP 1 pipette de 4,02 mL -

FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour spot-on INDICATIONS D'UTILISATION

SPECIFIANT LES ESPECES CIBLES : Affections à parasites sensibles au fipronil.

Chez les chats : Traitement curatif et préventif des infestations par les puces (Ctenocephalides felis) et par les tiques. Elimination des poux broyeurs.

La durée de protection contre les nouvelles infestations est de 4 semaines pour les puces et de 2 semaines pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP).

Chez les chiens de 2 à 10 kg, de 10 à 20 kg et de 20 à 40 kg : Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et par les tiques. Elimination des poux broyeurs.

La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces et d'un mois pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP).

Chez les chiens de 40 à 60 kg : Elimination des puces et des tiques sensibles au fipronil. Prévention des nouvelles infestations par les puces pendant deux mois. Prévention des nouvelles infestations par les tiques pendant un mois.

Elimination des poux broyeurs. La spécialité peut être intégrée dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP).

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION : En application sur la peau. En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines.

Chez les chats : Une pipette de FRONTLINE Spot-On Chat par animal (0,5 ml). Chiens de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On S par animal (0,67 ml). Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On M par animal (1,34 ml).

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On L par animal (2,68 ml). Chiens de 40 à 60 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On XL par animal (4,02 ml). Pour les chiens de plus de 60 kg, appliquer une pipette de 4,02 ml ainsi qu'une pipette du volume inférieur approprié.

CONTRE-INDICATIONS : Chez les chats : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc.) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.
Chez les chiens : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc.) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Ce produit a été spécialement développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage.

EFFETS INDESIRABLES : En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée.

Chez les chats : parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser.

Chez les chiens : parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit ou une alopecie généraux ont été rapportés.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser. -

USAGE EXTERNE - NE PAS AVALER USAGE VETERINAIRE - Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : MERIAL - 29 AVENUE TONY GARNIER - 69007 LYON

Présentations :

FRONTLINE Spot-On Chat : AMM n°FR/V/8481982 4/1996 délivrée le 16/02/1996 :

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,5 ml ; Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 ml ;

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,5 ml ; Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 ml. **FRONTLINE Spot-On Chien S :** AMM n°FR/V/1786870 3/1996 délivrée le 12/11/1996 :

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,67 ml ; Carte de 2 pipettes à embout sécable de 0,67 ml ; Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,67 ml ;

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,67 ml ; Carte de 4 pipettes à embout sécable de 0,67 ml ; Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0,67 ml ;

Carte de 8 pipettes à embout sécable de 0,67 ml ; Carte de 12 pipettes à embout sécable de 0,67 ml. **FRONTLINE Spot-On Chien M :** AMM n° FR/V/8858273 3/1996 délivrée le

12/11/1996 : Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1,34 ml ;

Carte de 2 pipettes à embout sécable de 1,34 ml ; Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1,34 ml ; Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 1,34 ml ;

Carte de 4 pipettes à embout sécable de 1,34 ml ; Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1,34 ml ; Carte de 8 pipettes à embout sécable de 1,34 ml ; Carte de 12 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

FRONTLINE Spot-On Chien L : AMM n° FR/V/6442706 9/1996 délivrée le 12/11/1996 :

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2,68 ml ; Carte de 2 pipettes à embout sécable de 2,68 ml ;

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2,68 ml ; Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 2,68 ml ; Carte de 4 pipettes à embout sécable de 2,68 ml ;

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2,68 ml ; Carte de 8 pipettes à embout sécable de 2,68 ml ; Carte de 12 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

FRONTLINE Spot-On Chien XL : AMM n° FR/V/4589892 9/2001 délivrée le 20/06/2001 :

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4,02 ml ; Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4,02 ml ;

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 4,02 ml ; Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4,02 ml. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.